

Guía práctica de semaglutida para pacientes

Destinado a pacientes que ya hayan recibido la prescripción de medicamentos por parte de un profesional de la salud.

0800 345 NOVO(6686)
hola@novoalapar.com.ar
www.novoalapar.com.ar

Horarios de Atención
Lunes a viernes de 9 a 21 hs.
Sábados de 9 a 13 hs.

novo nordisk®

¿Qué es Semaglutida?

Semaglutida es un medicamento que funciona como el GLP-1, una hormona natural del cuerpo que regula los niveles de azúcar en la sangre y se libera al comer. Por esta razón, semaglutida es utilizada en el tratamiento de la diabetes tipo 2.



Semaglutida en lapicera prellenada de etiqueta roja.
Proporciona dosis de 0,25 mg y 0,5 mg
Lapicera prellenada 1,5ml.



Semaglutida en lapicera prellenada de etiqueta verde.
Proporciona dosis de 1 mg
Lapicera prellenada 3ml.

Asegúrese de que tiene la lapicera correcta de acuerdo a la dosis que le prescribió su médico tratante.

¿Cuál es la dosis de Semaglutida?[1]

Siempre use este medicamento exactamente como su médico se lo indicó. El prospecto del producto recomienda usar el tratamiento de la siguiente manera:

INICIO	TITULACIÓN	MANTENIMIENTO
0,25 mg **Una vez a la semana durante 4 semanas**	**0,5 mg** Después de 4 semanas, incrementar la dosis a 0,5 mg una vez por semana.	**0,5 mg o 1 mg** Su médico puede incrementar la dosis a 1 mg una vez por semana si lo considera necesario. **Siempre hable con su médico antes de incrementar la dosis.**

No cambie su dosis a menos que su médico se lo indique.

¿Cuál es la frecuencia de uso?

Preferentemente siempre el mismo día de la semana, en cualquier horario, independientemente de las comidas.



Como recordatorio se recomienda anotar el día de la semana elegido en el envase. En caso de ser necesario, puede cambiar el día de su administración, siempre que hayan transcurrido por lo menos 2 días desde su última inyección de semaglutida.

¿Cuál es el método de administración?

- El medicamento debe ser inyectado bajo la piel (inyección subcutánea), no debe inyectarse en una vena o en un músculo.
- Los mejores lugares para hacerlo son: la parte delantera del muslo, el abdomen, o la parte superior del brazo.

RECUERDE: utilice siempre una aguja nueva para cada inyección. No utilice una aguja rota o dañada.

¿Qué hacer en caso de no haberse aplicado una dosis?

Si se olvida una dosis:[1]

- Esta se debe administrar tan pronto como sea posible y dentro de los 5 días posteriores a la dosis olvidada.
- En caso de que hayan transcurrido más de 5 días, se debe saltar la dosis olvidada y la siguiente dosis se debe administrar de forma habitual en el día programado.
- En cualquiera de los casos, ud. puede reanudar su esquema de dosificación habitual de una vez a la semana.

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Dosis olvidada	Administrar dosis olvidada				SALTAR LA DOSIS OLVIDADA		Próxima dosis

No se administre una dosis adicional ni aumente la dosis para compensar la dosis olvidada.

Consejos de utilidad

Los efectos adversos mas frecuentes son diarrea, náuseas, estreñimiento, falta de apetito, y dolor en el área estomacal. Estos efectos normalmente son leves o moderados. Es más probable que se presenten con las primeras aplicaciones del medicamento y que disminuyan o desaparezcan por completo a medida que se continúe su uso. Si experimenta náuseas o vómitos, puede seguir algunos consejos de utilidad:



Consulte a su médico si tiene alguna duda.

Referencias: 1. Ozempic® - Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud Certificado N° 59.167.**2.** Peng H, Want LL, Aroda VR, Current Diab Rep 2016; 16 (5): 44. DOI 10.1007/s11892-016-0728-4.

Material educativo destinado a pacientes a quienes se les haya prescrito el producto y se encuentren enrolados en un Programa de Cuidado al Paciente. Este material no reemplaza la opinión del profesional de la salud. Ante cualquier duda consulte a su médico.

VER INFORMACIÓN
DE PRODUCTO PARA PACIENTES
Certificado Nº 59.167.

Código QR
Si usted tiene dificultad con la lectura del Código QR, contactarse con:
atencioncli@novonordisk.com
0800-345-NOVO (6686)

AR23OZM00004