Información importante durante su tratamiento con Ozempic® (semaglutida)

Una guía simple para saber qué esperar, cómo cuidarse y cuándo consultar. Para información mas detallada, lea atentamente el prospecto.

Como todos los medicamentos, Ozempic® puede producir efectos adversos. Conocerlos puede ayudarlo a saber qué esperar durante el tratamiento, cómo cuidarse y cuándo hablar con su médico.

¿QUÉ ES OZEMPIC® Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Ozempic® está indicado para disminuir el azúcar en sangre (glucosa) en adultos con diabetes tipo 2.

Ozempic® se utiliza:

- Solo, cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar el nivel de azúcar en sangre y no puede utilizar metformina.
- Con otros medicamentos para disminuir el nivel de azúcar en sangre. Es importante respetar la dieta y el estilo de vida recomendados por su médico, farmacéutico o enfermero mientras utiliza Ozempic®.

ANTES DE UTILIZAR OZEMPIC®

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar Ozempic® si:

- tiene o ha tenido una enfermedad del páncreas;
- tiene una enfermedad renal grave o está realizándose diálisis;
- tiene una enfermedad de tiroides, incluyendo nódulos o agrandamiento de la glándula tiroides;
- utiliza sulfonilurea o insulina para tratar su diabetes;
- tiene diabetes tipo 1: su cuerpo no produce insulina;
- tiene cetoacidosis diabética: una complicación de la diabetes que ocurre cuando el cuerpo no puede degradar la glucosa porque no cuenta con suficiente insulina.

Informe también a su médico o farmacéutico si tiene alguna otra enfermedad, tiene alergias o está utilizando otros medicamentos, incluso si los adquirió por su cuenta.

¿Qué puede esperar y cómo cuidarse durante el tratamiento?

¿QUÉ PUEDE SENTIR DURANTE EL TRATAMIENTO?

Los efectos adversos más habituales incluyen:

- **Muy frecuentes:** náuseas y diarrea: generalmente desaparecen con el tiempo. Puede presentarse nivel bajo de azúcar en sangre (hipoglucemia), especialmente cuando Ozempic® se utiliza con una sulfonilurea o insulina. La hipoglucemia es frecuente cuando se combina con otros medicamentos usados para tratar la diabetes.
- **Frecuentes:** vómitos, indigestión, gastritis, reflujo o acidez, dolor de estómago, distensión abdominal, constipación, eructos, cálculos en la vesícula biliar, mareos, cansancio, pérdida de peso, disminución del apetito, gases, aumento de enzimas pancreáticas y complicaciones de la enfermedad ocular diabética (retinopatía diabética).

Manténgase hidratado: *Durante el tratamiento puede presentar náuseas, vómitos o diarrea. Estos efectos pueden provocar pérdida de líquidos. Es importante beber suficiente líquido para prevenir la deshidratación. Si tiene problemas renales, la deshidratación puede empeorarlos. Si tiene alguna duda o inquietud, por favor consulte a su médico*

AR26OZM00028| SEPTIEMBRE 2026 |Material educativo para pacientes con prescripción médica del producto. Ante cualquier duda consulte a su médico/a.

SEMANAL OZEMPIC® semaglutida

SI UTILIZA UNA SULFONILUREA O INSULINA

Cuando se utiliza junto con estos medicamentos. Ozempic® puede aumentar el riesgo de nivel bajo de azúcar en sangre (hipoglucemia).

Cómo reconocer un nivel bajo de azúcar en sangre

Los signos pueden aparecer repentinamente e incluir sudor frío, piel pálida y fría, dolor de cabeza, latidos acelerados del corazón, sensación de náuseas o de mucho apetito, cambios en la visión, somnolencia o debilidad, nervios, ansiedad o confusión, dificultad para concentrarse y temblores. Su médico le indicará cómo tratar los niveles bajos de azúcar en sangre y qué hacer si detecta alguno de estos signos de alerta.

SI TIENE ENFERMEDAD OCULAR DIABÉTICA (RETINOPATÍA)

Las mejoras rápidas en el control de la glucosa en sangre pueden provocar un empeoramiento temporal de la enfermedad ocular diabética, que podría requerir tratamiento o producir pérdida de visión. Informe a su médico si tiene retinopatía o si presenta problemas oculares durante el tratamiento con Ozempic®.

CUÁNDO CONSULTAR Y OTROS EFECTOS ADVERSOS

Cuándo debe consultar de inmediato

Busque atención médica o consulte a su médico de inmediato si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas:

Dolor severo y persistente en el estómago	Podría ser un signo de inflamación del páncreas (pancreatitis aguda). El dolor puede extenderse hacia la espalda.
Dificultad para respirar o hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta	Pueden ser signos de una reacción alérgica grave. También puede haber dificultad para tragar y latidos acelerados del corazón. Busque atención médica de urgencia.
Estreñimiento grave con otros síntomas	Si se acompaña de dolor de estómago, hinchazón abdominal o vómitos, podría tratarse de una obstrucción intestinal.

OTROS POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

También pueden presentarse otros efectos adversos. Si tiene alguno, hable con su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si no está listado aquí.

FRECUENCIA	EFECTOS ADVERSOS
Frecuentes (afectan de 1 a 10 personas de cada 100)	Vómitos; indigestión; inflamación del estómago (gastritis): los signos incluyen dolor de estómago, náuseas y vómitos; reflujo o acidez; dolor de estómago; distensión abdominal; constipación; eructos; cálculos en la vesícula biliar; mareos; cansancio; pérdida de peso; disminución del apetito; gases; aumento de enzimas pancreáticas; complicaciones de la enfermedad ocular diabética (retinopatía diabética)
Poco frecuentes afectan de 1 a 10 personas de cada 1.000)	Cambios en el gusto de los alimentos y las bebidas; pulso acelerado; reacciones en el sitio de inyección (moretones, dolor, irritación, picazón o erupciones); inflamación del páncreas (pancreatitis aguda), que puede causar dolor persistente severo en el estómago y la zona de la espalda; reacciones alérgicas como erupción cutánea, prurito o urticaria; retraso en el vaciamiento del estómago; inflamación de la vesícula biliar.
Raros (afectan de 1 a 10 personas de cada 10.000)	Reacciones alérgicas graves (reacciones anafilácticas, angioedema).
Frecuencia desconocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)	Obstrucción intestinal: una forma grave de estreñimiento con otros síntomas como dolor de estómago, hinchazón abdominal o vómitos.

Ante cualquier duda, consulte a su médico/a.
Ante cualquier inconveniente con el producto, puede completar el formulario de reporte electrónico de ANMAT o comunicarse con ANMAT Responde al 0800-333-1234.

AR26OZM00028| SEPTIEMBRE 2026 |Material educativo para pacientes con prescripción médica del producto. Ante cualquier duda consulte a su médico/a.

novo nordisk®
Novo Nordisk Pharma Argentina S.A.
Av. del Libertador 350 - Piso 3 | (B1638BEP)
Vicente López - Prov. de Buenos Aires
Domingo de Acassuso 3780/90 - 1° Piso "A" (Noroeste)
Olivos - Prov. de Buenos Aires
+54 11 5198 6686

Formulario de reporte electrónico de ANMAT:
https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos

Para obtener más información, consulte el prospecto incluido en el envase del producto, o escanee el siguiente código QR:

VER INFORMACIÓN DE PRODUCTO
PARA PACIENTES - OZEMPIC®
Certificado N° 59.167

Código QR
Si usted tiene dificultad con la lectura del Código QR, contactarse con: atencioncli@novonordisk.com o al 0800-345-NOVO(6686).