Información importante durante su tratamiento con Wegovy® (semaglutida)

Una guía simple para saber qué esperar, cómo cuidarse y cuándo consultar. Para información más detallada, lea atentamente el prospecto.

Como todos los medicamentos, Wegovy® puede causar efectos adversos, aunque no todas las personas los presentan. Conocerlos puede ayudarlo a saber qué esperar durante el tratamiento y cuándo hablar con su médico.

¿Y PARA QUÉ SE UTILIZA WEGOVY®?

Wegovy® se utiliza en combinación con dieta y actividad física para la pérdida de peso y para ayudar a mantener el peso bajo control.

- En adultos con un IMC de 30 kg/m² o superior (obesidad); o con un IMC de al menos 27 kg/m² pero menor de 30 kg/m² (sobrepeso) y problemas de salud relacionados con el peso, como diabetes, hipertensión arterial, niveles anormales de grasas en sangre, apnea obstructiva del sueño o antecedentes de infarto, accidente cerebrovascular o problemas vasculares.
- En adolescentes de 12 años de edad en adelante con obesidad y peso corporal mayor a 60 kg.

Como paciente adolescente, solo debe continuar utilizando Wegovy® si ha perdido al menos el 5% de su IMC después de 12 semanas de tratamiento con la dosis de 2,4 mg o la dosis máxima tolerada. Consulte a su médico antes de continuar.
El IMC (índice de masa corporal) es una medida de su peso en relación con su altura.

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a usar Wegovy®.

No se recomienda el uso de Wegovy® si:

- utiliza otros productos para perder peso;
- tiene diabetes tipo 1;
- tiene la función renal gravemente reducida;
- tiene la función hepática gravemente reducida;
- tiene insuficiencia cardíaca grave;
- tiene enfermedad ocular diabética (retinopatía).

- Si sabe que le realizarán una intervención quirúrgica en la que se someterá a anestesia, informe a su médico que está utilizando Wegovy®.

- Si tiene retraso en el vaciamiento gástrico (gastroparesia), hable con su médico antes de utilizar Wegovy®, ya que puede aumentar el riesgo de eventos adversos gastrointestinales serios o graves.

¿QUÉ PUEDE SENTIR DURANTE EL TRATAMIENTO?

- **Muy frecuentes:** dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor de estómago y sensación de debilidad o cansancio. Estos efectos adversos se observan principalmente durante el aumento escalonado de la dosis y normalmente desaparecen con el tiempo.

- **Frecuentes:** mareo, malestar estomacal o indigestión, eructos, gases, hinchazón del estómago, gastritis, reflujo o acidez estomacal, cálculos biliares, caída del cabello, reacciones en el sitio de inyección, cambios en el sabor de comidas o bebidas, cambios en la sensación de la piel y nivel bajo de azúcar en sangre (hipoglucemia) en pacientes con diabetes tipo 2.

novo nordisk®

SEMANAL wegovy® semaglutida inyectable

¿Qué puede esperar y cómo cuidarse durante el tratamiento?

Manténgase hidratado: Durante el tratamiento podría tener náuseas, vómitos o diarrea, que pueden provocar pérdida de líquidos. Es importante beber suficiente líquido para prevenir la deshidratación, especialmente si tiene problemas renales. Si tiene alguna duda o pregunta, hable con su médico.

SI TIENE DIABETES TIPO 2

- Wegovy® no puede utilizarse como sustituto de la insulina.
- No utilice Wegovy® en combinación con otros medicamentos que contengan agonistas del receptor de GLP-1, como liraglutida, dulaglutida, exenatida o lixisenatida.
- Usar una sulfonilurea o insulina junto con Wegovy® puede aumentar el riesgo de tener niveles bajos de azúcar en sangre (hipoglucemia). Su médico puede indicarle controles de azúcar en sangre y, si es necesario, ajustar la dosis de esos medicamentos.

Cómo reconocer un nivel bajo de azúcar en sangre (hipoglucemia)

Los signos pueden aparecer de forma repentina e incluir sudoración fría, piel pálida y fría, dolor de cabeza, latidos cardíacos acelerados, náuseas o hambre, cambios en la visión, sensación de somnolencia o debilidad, sensación de nerviosismo, ansiedad o confusión, dificultad para concentrarse o temblores. Su médico le indicará cómo tratar el nivel bajo de azúcar en sangre y qué tiene que hacer en el caso de que note estos signos de advertencia.

SI TIENE ENFERMEDAD OCULAR DIABÉTICA (RETINOPATÍA)

Si tiene enfermedad ocular diabética y está utilizando insulina, pueden producirse cambios en la visión. Las mejorías rápidas del control del azúcar en sangre pueden provocar un empeoramiento temporal de la retinopatía. Si tiene enfermedad ocular diabética y presenta problemas oculares mientras utiliza este medicamento, hable con su médico.

CUÁNDO DEBE CONSULTAR DE INMEDIATO

Busque atención médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas:

Dolor intenso y persistente en el área del estómago	Puede extenderse hacia la espalda y podría ser un signo de inflamación del páncreas (pancreatitis aguda).
Dificultad para respirar o hinchazón importante	También pueden aparecer sensación de mareo o aturdimiento, latidos cardíacos acelerados, transpiración, pérdida del conocimiento o hinchazón rápida bajo la piel en áreas como la cara, la garganta, brazos y piernas. Estos pueden ser signos de una reacción alérgica grave. La hinchazón de la garganta puede bloquear el paso del aire y poner en peligro la vida.
Pérdida repentina o empeoramiento rápido de la visión	Podría deberse a un efecto adverso muy raro llamado neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION). Su médico puede derivarlo a un examen oftalmológico y puede que deba interrumpir el tratamiento.
Estreñimiento intenso con otros síntomas	Si se acompaña de dolor de estómago, hinchazón abdominal o vómitos, podría tratarse de una obstrucción intestinal.

OTROS POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Además de los efectos mencionados anteriormente, pueden presentarse los siguientes efectos adversos. Si tiene algún efecto adverso, hable con su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto adverso que no esté listado aquí.

FRECUENCIA	EFECTOS ADVERSOS
Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)	• Sentirse mareado • Malestar estomacal o indigestión • Eructos • Gases (flatulencias) • Hinchazón del estómago • Estómago inflamado ("gastritis") – los signos incluyen dolor de estómago, náuseas o vómitos • Reflujo o acidez estomacal • Cálculos biliares • Caída del cabello (puede ocurrir más frecuentemente con semaglutida 7,2 mg) • Reacciones en el sitio de inyección • Cambio en el sabor de la comida o la bebida • Cambio en la sensación de la piel (normalmente desaparece con el tiempo y puede ocurrir más frecuentemente con semaglutida 7,2 mg) • Nivel bajo de azúcar en sangre (hipoglucemia) en pacientes con diabetes tipo 2.
Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)	• Baja presión arterial • Sensación de mareo o aturdimiento al ponerse de pie o sentarse debido a un descenso de la presión arterial • Latidos cardíacos acelerados • Aumento de enzimas pancreáticas (como lipasa y amilasa) en análisis de sangre • Retraso en el vaciamiento del estómago
Efectos adversos graves - frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)	• Complicaciones de la enfermedad ocular diabética (retinopatía diabética). Si tiene diabetes, informe a su médico si presenta problemas oculares, como cambios en la visión, durante el tratamiento.
Efectos adversos graves - poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)	• Inflamación del páncreas (pancreatitis aguda). Consulte al médico de inmediato ante dolor intenso y persistente en el estómago, que puede trasladarse a la espalda.
Efectos adversos graves - raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)	• Reacciones alérgicas graves (reacciones anafilácticas, angioedema). Busque ayuda médica de inmediato ante dificultad para respirar, hinchazón, mareo o aturdimiento, latidos cardíacos acelerados, transpiración, pérdida del conocimiento o hinchazón rápida bajo la piel. La hinchazón de la garganta puede bloquear el paso del aire y poner en peligro la vida.
Efectos adversos graves - muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas)	• Neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION), que puede causar pérdida de visión sin dolor en uno de los ojos. Contacte inmediatamente a su médico si nota una pérdida repentina o un empeoramiento progresivo de la visión.
Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)	• Obstrucción intestinal: una forma grave de estreñimiento con otros síntomas como dolor de estómago, hinchazón abdominal o vómitos.

Ante cualquier duda, consulte a su médico/a.
Ante cualquier inconveniente con el producto, puede completar el formulario de reporte electrónico de ANMAT o comunicarse con ANMAT Responde al 0800-333-1234.

Formulario de reporte electrónico de ANMAT:
https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos

AR26SEMO00133 | SEPTIEMBRE 2026 |Material educativo para pacientes con prescripción médica del producto. Ante cualquier duda consulte a su médico/a.

Para obtener más información, consulte el prospecto incluido en el envase del producto, o escanee el siguiente código QR:

VER INFORMACIÓN DE PRODUCTO
PARA PACIENTES - WEGOVY®
Certificado N° 59.900

Código QR
Si usted tiene dificultad con la lectura del Código QR, contactarse con: atencioncli@novonordisk.com o al 0800-345-NOVO(6686).

Novo Nordisk Pharma Argentina S.A.
Av. del Libertador 350 - Piso 3 | (B1638BEP)
Vicente López - Prov. de Buenos Aires
Domingo de Acassuso 3780/90 - 1° Piso "A" (Noroeste)
Olivos - Prov. de Buenos Aires
+54 11 5198 6686